





























Moseatlas

| | | |
|--|---|---|
| <p>Bjørnemose - <i>Polytrichum</i> sp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • lang, ugreina stengel • stive blad • økologi: ulike artar som finst i myrer og på fuktig grunn i barskog, helst på næringsfattige stader |  |  <p>Firkanta kapsel</p>  <p>Nerven fyller mesteparten av bladet</p>  |
| <p>Sigdmose - <i>Dicranum</i> sp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • øvste blad sigdforma og bøygd i same retning • økologi: ulike artar som er vanlege i både gran- og furuskog |  |  <p>Kapslane sit oftast i knippe</p>  <p>Lange, smale og bøygde blad</p> |
| <p>Etasjemose - <i>Hylocomium splendens</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dobbelt fjærgreina skot • greiner i tydelege etasjar, nye etasjar blir danna litt innanfor spissen av den førre • raudleg stengel, blanke blad • økologi: vanlegast i granskog |  |  <p>Svak dobbelnerve i bladet</p>  |
| <p>Tujamose - <i>Thuidium tamariscinum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dobbelt fjærgreina skot • greiner i etasjar • grøn- eller svartaktig stengel, matte blad • økologi: fuktige artsrike skogar, ikkje veldig vanleg |  |  <p>Blad med nerve</p>  <p>Trådforma utvekstar (parafylliar)</p> |
| <p>Fjørmose - <i>Ptilium crista-castrensis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • enkelt fjørgreina skot • små kloforma blad • grøn stengel • økologi: vanlegast i eldre, litt fuktig granskog |  |  <p>Blad med langsgående foldar</p>  <p>Utydeleg dobbelnerve</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Furumose - <i>Pleurozium schreberi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • enkelt fjørgreina skot • spreidde greiner av ulik lengde • raudleg stengel (skrap bort stengelblad) • økologi: vanlegast i tørre barskogar, spesielt furuskog |  |  |
| <p>Kransmose - <i>Rhytidiadelphus</i> sp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • lange skot med sprikande blad • økologi: fuktig grasmark, plenar og enger |  |  |
| <p>Torvmose - <i>Sphagnum</i> sp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • enkel stengel • 3–7 greiner frå same punkt på stengelen • mjuk konsistens, ofte med stort vassinnhald • økologi: ulike artar som er vanlegast i myr, men også i fuktig skog |  |  |
| <p>Fagermose - <i>Mnium</i> sp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • store, runde eller eggforma blad som er gjennomskinlege og med tydeleg nerve • økologi: ulike artar som lever i fuktig, skuggfull skog, særleg langs bekkedrag |  |  |
| <p>Tvaremose - <i>Marchantia polymorpha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ikkje skilje mellom stengel og blad • 1–2 cm breie flikar, mørkare grøn midtribbe • paraplyliknande utvekstar • små porer på overflata, synlege som svarte prikkar • økologi: grøftekantar og anna forstyrta, fuktig mark |  |  |
| <p>Vårnase - <i>Pellia epiphylla</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • thalløs levermose (stamme utan tydelege blad) med lappa og krusa rand • manglar porer og «paraplyar», men har lange, skjøre kapselstilkar • veks ofte i store matter • økologi: finst på våt jord i grøfte- og bekkeantar |  |  |