


Hva slags insektlarve?

Selv om larver kan være vanskelig å bestemme til art, er det enkelt å finne ut om en larve blir til en flue, bille, sommerfugl eller veps – *det er bare å telle bein!* Insektlarver har to typer bein: De seks vanlige insektbeina (3 par) foran og noe som kalles vorteføtter bak (se figur). Det er antallet, eventuelt fraværet av disse som bestemmer hva slags insekt vi ser på. Bli med og tell!



<p>Fluelarver</p>	<p>Fluelarver har verken insektbein eller vorteføtter. Kalles også maggot.</p>	
<p>Billelarver</p>	<p>Billelarver har <i>kun</i> insektbein. Den har <i>ikke</i> vorteføtter</p>	
	<p>Marihøna er en bille. Her ser dere en marihønelarve.</p>	
<p>Sommerfugllarver</p>	<p>Sommerfugler har insektbein foran og <i>5 par eller færre</i> vorteføtter bak.</p>	
	<p>Et unntak hos sommerfuglene er målerlarvene. De har <i>to par vorteføtter</i> bak og går på denne karakteristiske buktende måten</p>	
<p>Vepselarver</p>	<p>Vepselarver har insektbein foran og <i>6 par eller flere</i> vorteføtter bak.</p>	